Clef des *Ellobiidae*

1- Coquille en cône court trapu à tours convexes, à apex obtus, de maxi 2.5 mm, ouverture sans dent ; *espèce endémique des eaux souterraines pyrénéennes*

……..**Troglotin basque – *Iberozospeum bellesi***

1'- Coquille fusiforme ; ouverture dentée **.....2**

2- Coquille quasi transparente, incolore, brillante, devenant blanche quand l'animal est mort ; ouverture ne dépassant pas le tiers de la hauteur de la coquille, à 3 dents : 1 palatale, 1 pariétale et 1 columellaire ; maxi 2.5 mm ; *espèces terrestres* **.....3**


2'- Coquille non transparente ; ouverture larmiforme nettement étirée en pointe à sa partie supéro-externe dépassant nettement la moitié de la hauteur de la coquille, à 2 à 5 dents ± importantes ; taille de 5 à 15 mm ; *espèces des eaux littorales atlantiques* **.....4**

3- Coquille fusiforme trapue à 4-4.5 tours, à rapport hauteur / largeur < 2

.....**Auriculette naine – *Carychium minimum***


3'- Coquille fusiforme plus élancée à 5 tours, rapport hauteur / largeur > 2

……..**Auriculette commune – *Carychium tridentatum***



Carychium minimum

4- Coquille fusiforme de 8-12 mm à 7-8 tours ; 3 à 5 dents de taille et disposition variables : 2 columellaires, 1-2 pariétales plus petites et une palatale inconstante ; apex arrondi souvent dévié …….**Grande Éllobie – *Myosotella myosotis***
(**Note** : *un taxon très semblable présentant plusieurs dents implantées sur la face interne du bord externe est considéré soit comme forme de Myosotella myosotis, soit comme espèce valide* **Éllobie des rochers - *Myosotella denticulata***. *Les juvéniles de Myosotella présentent des poils épars sur une ligne proche des sutures ; chez Ovatella les poils sont plus nombreux et répartis plus largement notamment sur le dernier tour).*
4'- Coquille fusiforme ventrue < 8 mm à 5-6 tours **….5**





Adulte & Juvénile

5- coquille fusiforme blanche lisse à stries fines de croissance ; dernier tour < 75 % de la coquille, ouverture < 65 % de la coquille à 2 plis columellaires de taille différente
…...**Éllobie blanche – *Leucophytia bidentata***

5'- coquille fusiforme large brune ambrée sur le frais **....6**

6- coquille fusiforme obèse à stries de croissance entrecoupées de stries spirales ± ondulées ; dernier tour ≥ 85 % de la coquille, ouverture < 75 % de la coquille ; 2 dents pariétales de taille différente et un pli columellaire épais ; *exceptionnelle des corniches basques* ……**Éllobie de Biscaye – *Pseudomelampus exiguus***

6'- Coquille fusiforme lisse ; dernier tour < 75 % de la coquille et ouverture < 65 % de la coquille ; 2 fortes dents pariétales quasi égales, un pli columellaire fort et en général un cal palatal ; *une citation d'une corniche du pays basque à confirmer (?) car serait de première mention nationale* ……..***Ovatella aequalis***

