

Clef des Valloniidae

- 1-** Coquille costulée à spinulée**2**
1'- Coquille lisse à finement striée**5**
- 2-** Coquille à spire plus haute que large, avec crêtes spinulées
[Escargotin hérisson – *Acanthinula aculeata*](#)
2'- Coquille à spire plus large que haute, simplement costulée**3**
- 3-** Ombilic env. = au quart du diamètre de la coquille à péristome sans lèvre récurvée[Escargotin des montagnes – *Gittenbergia sororcula*](#)
3'- Ombilic env. = au tiers du diamètre de la coquille à péristome marqué par une lèvre blanche récurvée**4**
- 4-** Stries espacées, aiguës et fortes ; ubiquiste
[Vallonie costulée – *Vallonia costata*](#)
4'- Stries fines et serrées ; localisée dans les marais calcicoles
[Vallonie des marais – *Vallonia enniensis*](#)
- 5-** Coquille à 3 tours, péristome à lèvre peu récurvée, forme générale plutôt elliptique avec ombilic légèrement excentré
[Vallonie des pelouses – *Vallonia excentrica*](#)
5'- Coquille à 3 tours 1/4, péristome nettement et franchement récurvé ; forme générale circulaire à ombilic central
[Vallonie trompette – *Vallonia pulchella*](#)

Rédaction P. Duboc ; illustrations SLEM et INPN

