

Clef des Valloniidae

- 1- Coquille costulée à spinulée 2
- 1'- Coquille lisse à finement striée 5

- 2- Coquille à spire aussi haute que large, avec crêtes spinulées [Escargotin hérisson – *Acanthinula aculeata*](#)
- 2'- Coquille à spire plus large que haute, simplement costulée 3

- 3- Ombilic env. = au quart du diamètre de la coquille à péristome sans lèvre éversée [Escargotin des montagnes – *Gittenbergia sororcula*](#)
- 3'- Ombilic env. = au tiers du diamètre de la coquille à péristome marqué par une lèvre blanche éversée 4

- 4- Stries espacées, aiguës et fortes ; ubiquiste [Vallonie costulée – *Vallonia costata*](#)
- 4'- Stries fines et serrées ; localisée dans les marais calcicoles [Vallonie des marais – *Vallonia pulchella* var. *enniensis*](#)

- 5- Coquille à 3 tours, péristome à lèvre peu récurvée, forme générale plutôt elliptique avec ombilic légèrement excentré [Vallonie des pelouses – *Vallonia pulchella* var. *excentrica*](#)
- 5'- Coquille à 3 tours 1/4, péristome nettement et franchement récurvé ; forme générale circulaire à ombilic central [Vallonie trompette – *Vallonia pulchella*](#)

Note : la dernière étude phylogénétique sur le genre *Vallonia* démontre que *V. enniensis* et *V. excentrica* ne sont que des formes de *V. pulchella*.

