Clef des *Pristilomatidae*


1- Coquille à striation radiale et spirale marquée, de maxi 2,2 mm de diamètre ; ombilic large = au 1/3 de la coquille ; ouverture arrondie désaxée ; *espèce exotique accidentelle dans les serres* ……..... ***Hawaiia minuscula***

1'- Coquille lisse translucide ; ombilic réduit ≤ 1/6ème du diamètre de la coquille ; ouverture non désaxée ; diamètre ≥ 2,5 mm **....2**

2- Ombilic ouvert bien visible **.....3**

2'- Ombilic minuscule en partie couvert par la lèvre columellaire du péristome **....4**






3- Coquille à ombilic quasi centré = 1/6ème du diamètre de la coquille ; coquille de maxi 2.5 mm de diamètre et 1.5 mm de hauteur

……..**Cristalline ombiliquée – *Vitrea contracta***

3'- Coquille à ombilic légèrement excentré = 1/8ème du diamètre de la coquille ; diamètre de 3-4 mm, hauteur maxi 2 mm

…….**Cristalline commune – *Vitrea crystallina***



4- Coquille > 3.5 mm de diamètre jusqu'à 4.5 mm ; 5.5 tours ; ouverture présentant en général un léger épaississement interne ; ombilic quasi totalement obturé chez l'adulte ...…..**Cristalline diaphane – *Vitrea diaphana***

4'- Coquille < 3.5 mm de diamètre ; 4.5 à 5 tours ; ouverture sans jamais d'épaississement ; ombilic minuscule ouvert chez l'adulte ; *les 2 espèces ne seraient distinguables que par dissection extrêmement précise basée sur l'aspect du flabellum, structure implantée à l'intérieur du pénis mais à confirmer car caractère très variable ! V. narbonensis est exceptionnelle en limite SE de NA (1 seule donnée !!), V. subrimata assez largement présente dans les Pyrénées* ……..**Cristalline de Narbonne – *Vitrea narbonensis***

…….**Cristalline méridionale – *Vitrea subrimata***

