

## ***Clef générale des familles – partie II*** ***(Coquilles spiralées plus larges que hautes)***

**ATTENTION**, les illustrations de cette clef générale ne sont pas à l'échelle.

**1-** Coquille épaisse, en forme de demi œuf dur, spire réduite, non proéminente ; ouverture en demi-lune ; couleur jaunâtre à verdâtre à zébrures brun foncé à rougeâtre ; zones caillouteuses dans les eaux courantes ; une seule espèce localement .....[Nérîte des rivières – \*Theodoxus fluviatilis\*](#).... **NERITIDAE**


**1'-** Coquille différente .....**2**

**2-** Forme de l'ouverture proche d'un cercle, faisant penser à un tube fermé (section circulaire) tangeant au tour précédent ou partiellement plaqué contre lui ; péristome bien souvent continu ; espèce toujours pourvues d'opercule .....**3**


**2'-** Ouverture de forme différente de celle d'un cercle, faisant d'avantage penser à un tube ouvert (section en U) dont le bord extérieur s'appuie sur le tour précédent ; péristome bien souvent interrompu ou différent dans la zone pariétale .....**4**

**3-** Spire conique basse à dernier tour fortement augmenté ; taille de maxi 2 mm ; espèce des eaux souterraines .....[HYDROBIIDAE](#)

**3'-** Spire totalement déprimée enroulée dans un seul plan .....[VALVATIDAE](#)



- 4-** Coquille enroulée dans un seul plan **...5**
- 4'-** Coquille à spire ± élevée **...7**
- 5-** Espèces aquatiques ; coquille peu épaisse ; péristome sans boursofflure  
.....**PLANORBIDAE**
- 5'-** Espèces terrestres ; coquille épaisse à profond ombilic **...6**
- 6-** Péristome « cabossé », épais blanc et réfléchi ; coquille brune uniforme < 15 mm ; juvéniles notablement poilus, pilosité très souvent caduque chez l'adulte  
.....**HELICODONTIDAE**
- Une seule espèce localement .. **Veloutée plane – Helicodonta obvoluta***
- 6'-** Péristome régulier, mince réfléchi ; coquille glabre brune-jaune marquée de quelques stries radiales jaunes, < 30 mm ; *une espèce localisée au Pays basque*  
**Escargot de Quimper – Elona quimperiana**.....**ELONIDAE**
- 7-** Péristome non différencié ; jamais de poils ou de lamelles, jamais de coquilles fraîches blanches ou jaunes ni de bandes spirales colorées plus sombres ou plus claires que le fond de la coquille, jamais de coquilles nettement carénées  
**...8**
- 7'-** Péristome en général plus ou moins différencié : élargissement en lèvre éversée au minimum dans la région collumellaire, présence à l'intérieur de l'ouverture d'une côte transverse renforcée, denticules etc., OU ALORS présence d'un des caractères toujours absents dans l'autre option **...22**
- 8-** Largeur de l'ouverture au moins égale à la moitié du diamètre de la coquille et nombre de tours réduits (maximum 3,5), coquille trop petite pour que l'animal puisse se rétracter entièrement à l'intérieur et partiellement recouverte par un lobe du manteau  
.....**VITRINIDAE**
- 8'-** Coquille ne réunissant pas l'ensemble de ces caractères **...9**
- 9-** Coquille élevée, pyramidale ; hauteur de la coquille de plus de 0,5 fois le diamètre ; diamètre de moins de 4 mm **...10**
- 9'-** Spire déprimée, hauteur de la coquille de moins de 0,5 fois le diamètre  
**...11**
- 10-** Ombrilic de taille réduite ou absent ; coquille en pyramide légèrement bombée (rappelant une toupie) ; ouverture en croissant.....**EUCONULIDAE**
- 10'-** Ombrilic large = env. 1/3 du diamètre de la coquille ; coquille pyramidale avec une ouverture ovale  
.....**PYRAMIDULIDAE**



- 11-** Ombrilic large = environ le 1/3 du diamètre de la coquille ....**12**
- 11'-** Ombrilic  $\leq$  au 1/4 du diamètre de la coquille ....**13**
- 12-** Coquille translucide lisse, brun jaunâtre, stries d'accroissement peu marquées ; diamètre de maximum 2.5 mm .....**HELICODISCIDAE**  
Une seule espèce localement ..... [Luisantine scintillante – \*Lucilla scintilla\*](#)
- 12'-** Coquille à fortement côtelée  $\pm$  tachetée, côtes fortes et régulières, rappelant une corde enroulée sur elle-même ; diamètre de 5 à 7 mm .....**DISCIDAE**  
Une seule espèce localement .....[Bouton commun – \*Discus rotundatus\*](#)
- 13-** Coquille à striation nette serrée ou fortes côtes régulièrement espacées ; ombrilic large ( $\geq$  1/4 du diamètre) ; striation radiale et spirale ; diamètre  $<$  2.5 mm ....**14**
- 13'-** Coquille plutôt lisse et/ou à stries très fines et serrées ; ombrilic en général  $<$  au 1/4 du diamètre de la coquille ....**16**
- 14-** Coquille à costules fines espacées, diamètre ne dépassant pas 2 mm, à spire plate de maxi 3.5 tours .....**PUNCTIDAE**
- 14'-** Coquille à striation marquée serrée régulière ; spire basse déprimée ....**15**
- 15-** Coquille blanche de maxi 2.5 mm ; ouverture arrondie désaxée .....**PRISTILOMATIDAE**
- 15'-** Coquille ambré de maxi 1.5 mm ; ouverture en U non désaxée .... **PUNCTIDAE**



**16-** Tours très serrés, à croissance diamétrale très faible ; ombilic très étroit ou fermé ; coquille transparente .....**PRISTILOMATIDAE**

**16'-** Croissance diamétrale nette, dernier tour nettement élargi par rapport aux précédents ....**17**

**17-** Coquille plutôt élevée, 4,5 tours, stries de croissance irrégulières bien visibles, ouverture arrondie ; animal noir ; la coquille paraît noire sur l'animal vivant, avec une tache orange juste au dessus de l'ouverture .....**GASTRODONTIDAE**

**17'-** Coquille ne réunissant pas ces critères ....**18**

**18-** Coquille à dernier tour s'accroissant fortement (plus du double de l'avant-dernier) à stries radiales marquées ; coquille < 5 mm .....**GASTRODONTIDAE**

(NOTE : pendre la mesure de l'avant-dernier tour dans l'axe de l'apex (1) et du dernier au niveau de l'ouverture (2))

**18'-** Coquille à dernier tour s'accroissant ± fortement, soit à fines stries radiales, soit à la fois à stries radiales et spirales ....**19**

**19-** Pas de striation spirale (examiner à la loupe la face inférieure de la coquille) ...**20**

**19'-** Striation radiales et spirales s'entrecroisant ....**21**

**20-** Coquille de 18-30 mm, à spire conique basse, dernier tour > 2 fois plus large que l'avant dernier ; ouverture aussi large que haute .....**GASTRODONTIDAE**




**20'-** Coquille < 14 mm, à spire basse déprimée, dernier tour en général au maxi 2 fois plus large que l'avant-dernier ; ouverture ovale .....**OXYCHILIIDAE**

**21-** Coquille lisse, ± translucide luisante, à striation radiale fine ; spire déprimée ; taille < 11 mm .....**GASTRODONTIDAE**

**21'-** Coquille non translucide luisante avec striation radiale marquée entrecroisée avec striation spirale ; spire basse ; taille de 30-40 mm .....**ZONITIDAE**

*Une seule espèce introduite localement* ....**Escargot peson – Zonites algirus**







- 22-** Ombrilic fermé ou réduit à une minuscule fente .....**HELICIDAE**
- 22'-** Ombrilic ouvert ; parfois partiellement recouvert par le péristome le rendant très discret ....**23**
- 23-** Coquille avec une carène périphérique très nette ....**24**
- 23'-** Coquille à périphérie sans carène, parfois à périphérie légèrement anguleuse obtuse ....**26**
- 24-** Coquille discoïde plate, régulièrement et fortement costulée ; ombrilic profond = env. 1/3 de la coquille ; taille < 9 mm ; *espèces exceptionnelles du Pays basque* .....**TRISSEXODONTIDAE**
- 24'-** Coquille non costulée lisse à striée ; diamètre ≥ 10 mm ....**25**
- 25-** Coquille plate avec une carène très forte, beige à brune, bien souvent avec des marques plus foncées rayonnantes ; ombrilic très large .....**HELICIDAE**
- 25'-** Coquille conique à minuscule ombrilic, et carène obtuse .....**HYGROMIIDAE**
- 26-** Coquille de couleur assez uniforme, sans bande spirale contrastée ....**27**
- 26'-** Coquille bien souvent blanche ou jaune marquée de bandes sombres ± continues ou de marbrures foncées ; si elle est beige ou brune, présence au minimum d'une bande spirale sombre ou de dessins radiaux sombres ....**31**
- 27-** Coquille glabre ....**28**
- 27'-** Coquille poilue, ATTENTION cette pilosité est souvent caduque chez les adultes ....**29**
- 28-** Coquille lisse à finement striée, périphérie arrondie ; ombrilic en général petit partiellement recouvert par la partie columellaire du péristome ; ouverture en U .....**HYGROMIIDAE**
- 28'-** Coquille nettement et régulièrement costulée ; ombrilic large ; périphérie obtusément anguleuse ; ouverture en croissant aplati .....**TRISSEXODONTIDAE**

**Note :** Si coquille à spire arrondie, uniformément jaune à blanche (rarement une bande spirale brune), ombrilic profond = 1/6ème du diamètre, coquille translucide laissant voir de petites macules sombres ; présence potentielle accidentelle de l'Hélice cerise - *Fruticicola fruticum* (BRADIBAENINAE)



**29-** Coquille à marbrures et taches foncées, à stries fortes et espacées

.....**GEOMETRIDAE**

**29'** Coquille de couleur uniforme, à striation fine irrégulière **....30**

**30-** Coquille à spire globuleuse à maxi 4 tours, ombilic ouvert très partiellement recouvert par la partie columellaire du péristome .....**GEOMETRIDAE**

**30'** Coquille à spire déprimée à maxi 7 tours, ombilic large non recouvert  
.....**HYGROMIIDAE**

**31-** Spire brusquement rabattue vers le bas juste avant l'ouverture ; ouverture nettement inclinée, péristome très net ; bien souvent au minimum une spirale sombre  
.....**HELICIDAE**

**31'** Spire non brusquement rabattue vers le bas ; si c'est le cas, le péristome est faiblement différencié et il y a plusieurs bandes spirales brunes **....32**

**32-** Ombilic petit en partie ± recouvert par la partie columellaire du péristome ; pas de bandes foncées continues ou de marbrures foncées notables

.....**HYGROMIIDAE**

**32'** Ombilic bien ouvert et visible ; coquille ± marquée de bandes brunes ± continues et/ou de marbrures foncées .....**GEOMETRIDAE**

