

## Clef des Vitrinidae

**1-** Coquille à spire globuleuse de 3 tours arrondis à suture profonde, nettement striés ; ouverture occupant moins de la moitié de la coquille, sans ou à membrane calcifiée relictuelle

.....[Semilimace globuleuse – \*Oligolimax annularis\*](#)


**1'-** Coquille à spire basse, lisse translucide, suture à peine marquée, ouverture équivalant (**Ldt**) à au moins la moitié de la largeur de la coquille (**Lc**) ; manteau avec excroissance charnue couvrant en partie la coquille (**1**)

....**2**

**2-** Ouverture à largeur environ égale à la moitié de la largeur totale de la coquille, coquille à plus de 2 tours (jusqu'à 3.5), spire non entièrement visible par l'ouverture ; lobe du manteau couvrant partiellement la coquille

....**3**

**2'-** Ouverture occupant jusqu'au 2/3 de la largeur totale de la coquille, coquille à maxi 2 tours, spire quasi entièrement visible par l'ouverture, lobe du manteau large couvrant une grande partie de la coquille ; animal pâle moucheté de noir .....[Semilimace atlantique – \*Semilimax pyrenaicus\*](#)



- 3-** Lobe du manteau atteignant l'apex de la coquille ; corps sombre ± maculé ; dernier tour à profil un peu évasé égal à la moitié de la largeur totale de la coquille .....[Semilimace des plaines – \*Phenacolimax major\*](#)
- 3'-** Lobe du manteau n'atteignant jamais l'apex de la coquille ; corps clair moucheté ; dernier tour à profil arrondi à largeur un peu inférieure à la moitié de la largeur totale de la coquille  
.....[Semilimace commune – \*Vitrina pellucida\*](#)

Rédaction P. Duboc ; illustrations SLEM & INPN

