
Clef des *Vitrinidae*

1- Coquille à spire globuleuse de 5 à 6 mm de diamètre, à 3 tours arrondis à suture profonde, nettement striés ; ouverture occupant moins de la moitié de la coquille, sans ou à membrane calcifiée relictuelle ; ombilic minuscule en général visible ; *présence potentielle (?) car signalée en limite avec les Pyrénées centrales* ……..**Semilimace globuleuse – *Oligolimax annularis***

1'- Coquille à spire basse, lisse translucide, suture à peine marquée, ouverture équivalant à au moins la moitié de la largeur de la coquille **….2**

2- Ouverture à largeur environ égale à la moitié de la largeur totale de la coquille, coquille à plus de 2 tours jusqu'à 3, spire non entièrement visible par l'ouverture ; lobe du manteau couvrant partiellement la coquille **….3**

2'- ouverture occupant les 2/3 de la coquille à 1 tour 3/4, lobe du manteau large couvrant une grande partie de la coquille ; membrane de l'ouverture large et prolongée ; animal pâle à manteau moucheté de noir ; corps < 12 mm, coquille < 5 mm ….**Semilimace atlantique – *Semilimax pyrenaicus***





3- Lobe du manteau atteignant l'apex de la coquille ; dernier tour à profil un peu évasé égal à la moitié de la largeur totale de la coquille ; corps sombre ± maculé comme le lobe du manteau ; corps < 15 mm et coquille < 6 mm

…...**Semilimace des plaines – *Phenacolimax major***

3'- Lobe du manteau n'atteignant jamais l'apex de la coquille ; corps clair moucheté ; dernier tour à profil arrondi à largeur un peu inférieure à la moitié de la largeur totale de la coquille ; corps < 15 mm et coquille < 6 mm

….**Semilimace commune – *Vitrina pellucida***

