Clef des *Succinidae*


1- Premiers tours nettement renflés à suture profonde formant une spire occupant environ 1/4 de la longueur totale de la coquille ; ouverture occupant environ la moitié de la coquille ; coquille < 9 mm **....2**


2- coquille oblongue à ouverture pyriforme ; épiphallus *(EP)* long et torsadé, renflé dans sa partie distale, muscle rétracteur inséré *(MRP)* sur l'épiphallus


……...**Ambrette terrestre – *Succinella oblonga***

2'- coquille plus ventrue à ouverture plus arrondie ; épiphallus court non torsadé de diamètre égal, muscle rétracteur inséré sur l'extrémité du pénis *(P) ; espèce potentielle (?) car signalée en limite avec les Pyrénées centrales*

…….**Ambrette des sables - *Quickella arenaria***







1'- Premiers tours en spire courte par rapport au dernier tour qui occupe au moins 80 % de la coquille ; ouverture occupant au moins les 2/3 de la coquille ; coquille en général ≥ 9 mm **.....3**

3- Coquille à dernier tour à profil nettement bombé, la spire sommitale occupe moins du 1/4 de la coquille, corps en général pâle marqué d'une bande plus sombre ; coquille de 10 à 27 mm ……..**Ambrette amphibie – *Succinea putris***

3'- Coquille à dernier tour à profil fuyant, spire sommitale occupant en moyenne 1/5ème de la coquille, corps en général sombre ponctué ; coquille de 9 à 15 mm …….**Ambrette élégante – *Oxyloma elegans***

Note : *L'Ambrette aquatique - Pseudosuccinea columella (Lymnaeidae, p.111) pourrait être confondue avec Succinea putris, mais cette dernière n'a que des stries radiales.*

