

Clef des *Pristilomatidae*

1- Coquille à striation radiale et spirale marquée ; ombilic large = au 1/3 de la coquille ; ouverture arrondie désaxée ; espèce exogène connue que d'une seule serre horticole
.....[Hawaïia minuscula](#)

1'- Coquille lisse translucide ; ombilic réduit ; ouverture non désaxée**2**

2- Ombilic ouvert bien visible**3**

2'- Ombilic minuscule en partie couvert par la lèvre columellaire du péristome
.....**4**

3- Coquille à ombilic quasi centré = 1/6 ème du diamètre de la coquille ; coquille de maxi 2.5 mm de diamètre et 1.5 mm de hauteur

.....[Cristalline ombiliquée – Vitrea contracta](#)

3'- Coquille à ombilic légèrement excentré = 1/8 ème du diamètre de la coquille ; diamètre de 3-4 mm, hauteur maxi 2 mm

.....[Cristalline commune – Vitrea crystallina](#)

4- Coquille > 3.5 mm de diamètre jusqu'à 4.5 mm ; 5.5 tours ; ouverture présentant en général un léger épaissement interne ; ombilic quasi totalement obturé chez l'adulte

.....[Cristalline diaphane – Vitrea diaphana](#)

4'- Coquille < 3.5 mm de diamètre ; 4.5 à 5 tours ; ouverture sans jamais d'épaissement ; ombilic minuscule ouvert chez l'adulte ; les 2 espèces ne sont distinguables que par dissection !

.....[Cristalline de Narbonne – Vitrea narbonnensis](#)

.....[Cristalline méridionale – Vitrea subrimata](#)

