Clef des *Valloniidae*

1- Coquille costulée à spinulée **.....2**


1'- Coquille lisse à finement striée **.....5**


2- Coquille à spire aussi haute que large, avec crêtes spinulées
…….**Escargotin hérisson – *Acanthinula aculeata***

2'- Coquille à spire plus large que haute, simplement costulée **.....3**

3- Ombilic env. = au quart du diamètre de la coquille à péristome sans lèvre réfléchie …...**Escargotin des montagnes – *Gittenbergia sororcula***

3'- Ombilic env. = au tiers du diamètre de la coquille à péristome marqué par une lèvre blanche éversée ; **Note** : *Les dernières études phylogénétiques ont démontré que seules Vallonia costata et Vallonia pulchella sont des espèces valides (Nekota et al., 2025)* **.....4**









Vallonia pulchella

4- Stries espacées, aiguës et fortes, dernier tour retombant vers l'ouverture ; *ubiquiste* ……...**Vallonie costulée – *Vallonia costata***

4'- Stries fines et serrées, dernier tour ne retombant pas vers l'ouverture ; *localisée dans les marais calcicoles*

……..**Vallonie des marais – *Vallonia pulchella var. enniensis***

5- Coquille à 3 tours, péristome à lèvre peu éversée, forme générale plutôt elliptique avec ombilic légèrement excentré

……..**Vallonie des pelouses – *Vallonia pulchella var. excentrica***

5'- Coquille à 3 tours 1/4, péristome nettement et franchement réfléchi ; forme générale circulaire à ombilic central ..**Vallonie trompette – *Vallonia pulchella***

