Clef des *Cochlostomatidae*

1- Coquille conique ≤ 8 mm, à tours fortement convexes arrondis, à sutures profondes, fortement côtelée à 6-8 côtes régulières par mm au niveau du dernier tour ; couleur de grisâtre à brun-rouge pâle avec jusqu'à trois lignes spiralées formées de taches plus sombres ; péristome blanc tacheté ± réfléchi ; coquille < 8 mm ……**Cochlostome commun – *Cochlostoma septemspirale***


1'- Coquille > 9 mm jusqu'à 15 mm à tours modérément convexes ; *espèces endémiques pyrénéennes* **….2**


2- Ouverture orbiculaire à large péristome blanc réfléchi **….3**


2- Ouverture à péristome plus étroit ; coquille conique élancée < 15 mm, jaunâtre brune claire à brune foncée avec une ou deux bandes discontinues plus foncées, 7 à 9 tours ; la surface varie de presque lisse striée pour ssp. *obscura* à sculptée avec 10-12 côtes saillantes / mm du dernier tour pour ssp. *laburdense* …..**Cochlostome montagnard – *Obscurella obscura***


3-péristome large sans bourrelet interne ; costules serrées (12 à 17 par mm sur le dernier tour) ; coquille conique élancée à 8 tours, de 9-11 mm, de couleur gris-marron violacé avec une ou deux bandes discontinues plus foncées ……**Cochlostome des éboulis – *Obscurella partioti***

3'- péristome large avec un net bourrelet interne ; costules espacées (5-6 par mm du dernier tour) ; coquille conique évasée lie-de-vin à 8 tours, de 10-15 mm ……..**Cochlostome cantabrique – *Obscurella hidalgoi***











Obscurella obscura laburdense